

Số: 338 /VHTT-PT

Nha Trang, ngày 20 tháng 3 năm 2018

V/v hướng dẫn tuyên truyền về phòng,
chống dịch bệnh cúm gia cầm trên
Đài Truyền thanh cơ sở.

Kính gửi: UBND các xã, phường.

Thực hiện văn bản số 1593/UBND-KT ngày 15/3/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai Công điện khẩn số 1263/CD-BNN-YT ngày 05/02/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT,

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau:

Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn hóa và Thông tin biên tập.

Thời gian tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh theo quy định Đài Truyền thanh cơ sở của địa phương.

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. / *Tu*

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Phòng Kinh tế (VBĐT) (b/c);
- Trưởng phòng;
- Phó trưởng phòng (Tr);
- Lưu: VT, Vy.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Cẩm Trang



BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về việc nêu cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm

(Kèm theo Công văn 339/VHTT-PT ngày 20 tháng 3 năm 2018)

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Đầu năm 2018, các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N2, A/H5N6, A/H5N8 đã phát sinh tại nhiều quốc gia, đặc biệt là cúm A/H7N9 tại Trung Quốc (01 người bị nhiễm phát hiện ngày 12/01/2018). Ở nước ta, hiện cả nước có 01 ổ dịch cúm A/H5N6 đã qua 21 ngày (ngày 13/3) tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Bệnh cúm gia cầm do virus gây ra, là loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan nhanh, tỷ lệ chết rất cao (100%), gây thiệt hại lớn về kinh tế. Các loài gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, chim cú, bồ câu, đà điểu, các loài chim hoang dã... đều có thể mắc bệnh.

Cách nhận biết gia cầm bị bệnh cúm là có các triệu chứng: sốt cao, ho, khó thở, phù đầu và mặt, mắt đỏ, mào và tích sưng to, da tím tái, da chân xuất huyết, chảy nước mắt, nước dãi, ỉa chảy rất nặng, phân xanh vàng. Mổ khám gia cầm bệnh thấy máu không đông; xoang bụng tích nước hoặc viêm dính; xuất huyết trên bề mặt các cơ và các cơ quan nội tạng, đặc biệt là ở dạ dày tuyến và ruột; xoang mũi và khí quản xuất huyết, chứa đầy dịch nhầy. Bệnh cúm gia cầm có thể lây sang người và một số động vật khác.

Do đó, mọi người dân hãy nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm để tránh tình trạng lây bệnh cúm từ gia cầm sang người như sau:

1. Đối với các hộ chăn nuôi phải thực hiện các biện pháp an toàn sinh học như sau:

- Cần áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;
- Các phương tiện dụng cụ chăn nuôi nên riêng biệt và vệ sinh tiêu độc ngay sau khi sử dụng.
- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại và phun thuốc sát khuẩn định kỳ 1-3 lần/tuần tùy theo mức độ, tính chất nguy cơ dịch bệnh. Những người vào khu chăn nuôi phải thực hiện biện pháp khử khuẩn trước và sau khi ra vào chuồng nuôi.
- Chỉ chọn mua gia cầm ở những cơ sở giống tốt, bảo đảm không có bệnh cúm, chọn những con khoẻ mạnh, nhanh nhẹn.
- Chuồng nuôi bảo đảm thoáng, mát, khô, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, sân vườn và ao nuôi phải có hàng rào bao quanh.

- Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, thức ăn cần đảm bảo dinh dưỡng, không ẩm mốc, nước uống sạch và phải được thay thường xuyên.

2. Các biện pháp xử lý khi gia cầm bị bệnh:

- Thực hiện **05 không**: **không** giết dịch, **không** mua bán, **không** vận chuyển gia cầm bệnh và sản phẩm của gia cầm bệnh ra khỏi vùng dịch, **không** giết mổ, **không** vứt xác gia cầm chết bừa bãi;

- Khi phát hiện có dịch hoặc gia cầm chết bất thường cần thông báo ngay với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, cán bộ thú y cơ sở để kịp thời xử lý; không tự ý xử lý.

- Không bán chạy, không ăn thịt gia cầm trong đàn bị bệnh, không vứt xác chết bừa bãi hay tiêu hủy toàn bộ số gia cầm bị bệnh;

- Bao vây ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ gia cầm chết, mắc bệnh và các gia cầm khác trong đàn, bằng cách dung củi hoặc xăng dầu để đốt. Nếu có điều kiện thì đốt trong các lò chuyên dụng.

- Đào hố chôn sâu, toàn bộ đáy và thành hố được lót nilông. Gia cầm tiêu hủy đựng trong bao dày, có chất sát trùng, buộc chặt miệng, sau đó cho xuống hố. Đảm bảo bề mặt gia cầm chôn cách mặt đất tối thiểu 1m. trước khi lấp đất, rải một lớp vôi bột hoặc phun một trong hai dung dịch: foocmol 5%, xút (NaOH) 3-5%.

3. Đối với người dân phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm lây lan từ vật nuôi qua người như sau:

- Khi tiếp xúc, giết mổ gia cầm, thủy cầm phải đeo găng tay, khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng;

- Không ăn tiết canh, thịt, trứng gia cầm, thủy cầm chưa nấu chín kỹ;

- Khi có biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, đau ngực, phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Toàn dân hãy nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm bằng cách thường xuyên vệ sinh môi trường chăn nuôi, tiêu độc khử trùng chuồng trại, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm. Đây là một biện pháp quan trọng để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm./.

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn

